

**Starazolin Lipid
Multi Balance
akių lašai, emulsija**

Vartojimo instrukcija – atidžiai perskaitykite

Starazolin Lipid Multi Balance akių lašai skirti vidutinio sunkumo ir sunkaus laipsnio akių sausumo simptomams, atsirandantiems dėl ašarų plėvelės lipidinio sluoksnio trūkumo, kuris lemia padidėjusį vandens sluoksnio garavimą ir akių sausumą, lengvinti.

SUDĖTIS

Starazolin Lipid Multi Balance yra sterilūs akių lašai, emulsija, kurios sudėtyje yra 0,15 % natrio hialuronato, 0,25 % ricinos aliejaus, tokoferzolino (vitamino E TPGS), glicerolio, polisorbato 80, makrogolglicerolio hidroksistearato, trometamolio, vandenilio chlorido rūgšties, dinatrio edetato, natrio chlorido, išgryninto vandens.

Ricinos aliejus, vitaminas E TPGS ir makrogolglicerolio hidroksistearatas sudaro ilgos grandinės trigliceridų (LCT) kompleksą.

Be konservantų.

Be fosfatų.

PASKIRTIS

Starazolin Lipid Multi Balance akių lašai skirti vidutinio sunkumo ir sunkiems sausų akių simptomams palengvinti. Jie atkuria ašarų plėvelės lipidinį sluoksnį, stabilizuoja ašarų plėvelę ir optimaliai drėkina akies paviršių.

Nepriklausomai nuo to, ar akys sausos dėl nepakankamo vandens, ar dėl nepakankamo lipidų kiekio ašarose, išsausėjęs akies paviršius sukelia nemalonius simptomus, kurie laikui bėgant tik stiprėja, jei nėra tinkamai gydomi. Akių sausumas gali pasireikšti smėlio ar svetimkūnio pojūčiu akyje, dirginimu, deginimu, niežuliu, pernelyg dideliu ašarojimu ir akių paraudimu.

Akių sausumas yra susijęs su senėjimo procesu, tam tikrų vaistų vartojimu, hormonų pokyčiais, akių pervargimu (kontaktinių lęšių nešiojimu), įvairiais aplinkos veiksniais (sausas oras, vėjas, oro kondicionieriai) ir daugeliu šiuolaikinio gyvenimo būdo pavojų, pavyzdžiui, ilgu žiūrėjimu į ekraną (kompiuterio, mobiliojo telefono, televizoriaus), kai labai sumažėja mirksnių skaičius per minutę, o kartu ir optimalus ašarų išsiskyrimas.

Starazolin Lipid Multi Balance sudėtyje yra **LCT komplekso** (sudaryto iš ricinos aliejaus, vitamino E ir paviršiaus aktyvių medžiagų) nanolašelių, **atkuriančių ir apsaugančių ašarų lipidinį sluoksnį, kuris yra natūralus barjeras, saugantis nuo drėgmės išgaravimo.**

Be to, **Starazolin Lipid Multi Balance** akių lašuose esantis natrio hialuronatas veiksmingai **drėkina akis** ir iš karto palengvina sausumo simptomus.

Tinka nuo visų tipų akių išsausėjimo.

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Starazolin Lipid Multi Balance vartoti negalima

- esant padidėjusiam jautrumui (alergijai) bet kuriai produkto sudedamajai daliai.

Jei pasireiškia alerginė reakcija, nedelsdami nutraukite preparato vartojimą ir kreipkitės į gydytoją.

Kiti įspėjimai

- Jei pastebėjote, kad preparato buteliukas arba aplikatorius yra pažeistas, nenaudokite jo.
- Siekiant užtikrinti saugų naudojimą ir higieną, buteliuką turi naudoti tik vienas asmuo.
- **Starazolin Lipid Multi Balance** akių lašų ir kitų akių lašų ar akių tepalų sąveika nėra žinoma. Jei vartojate kitų akių preparatų, prieš vartodami **Starazolin Lipid Multi Balance** pasitarkite su gydytoju.

Starazolin Lipid Multi Balance skirtas vartoti 18 metų ir vyresniems suaugusiems.

Prieš lašindami šiuos akių lašus vaikams, pasikonsultuokite su sveikatos priežiūros specialistu, kad įsitikintumėte, jog jie tinka Jūsų vaikui.

Pastaba:

Preparatas gali sukelti nedidelį regėjimo susilpnėjimą. Tokiu atveju rekomenduojama trumpą laiką nevairuoti automobilio, nevaldyti transporto priemonės ar mašinos, o palaukti, kol regėjimas normalizuosis.

PREPARATO SAUGUMAS

Starazolin Lipid Multi Balance akių lašuose nėra **konservantų** ir **fosfatų**, todėl sumažėja dirginimo ir akies paviršiaus pažeidimo galimybė.

Lašintuvo technologija apima filtrą, kuris užtikrina saugų preparato vartojimą, nes apsaugo akių lašus nuo užteršimo ir išsaugo jų sterilumą net 6 mėnesius po atidarymo.

Paprastai preparatas toleruojamas labai gerai, tačiau jei pastebėjote šalutinį poveikį, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

KAIP VARTOTI STARAZOLIN LIPID MULTI BALANCE

Visada vartokite **Starazolin Lipid Multi Balance** pagal šią vartojimo instrukciją. Jei abejojate, prieš vartodami pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Jei gydytojas nepaskyrė kitaip, lašinkite į akis 1–2 lašus kelis kartus per dieną pagal poreikį. Keletą kartų pamirskėkite, kad lašas tolygiai pasiskirstytų akies paviršiuje.

Venkite lašintuvo antgalio sąlyčio su akies ar bet kokių kitų paviršiumi.

Prieš vartojant pirmą kartą, buteliuką būtina aktyvuoti. Nuimkite nuo dozatoriaus kamštelį, apverskite buteliuką ir kelis kartus **paspauskite dozatorių, kol pasirodys pirmas lašas.**


Informacija kontaktinių lęšių naudotojams

Preparatą tinka vartoti su kontaktiniais lęšiais.


Vartojimo instrukcija

1. Kruopščiai nusiplaukite rankas.


2. Nuo dozatoriaus nuimkite kamštelį (1 pav.).
3. Suimkite dozatorių ranka, kaip parodyta 2 pav.
4. Apverskite buteliuką ir spauskite dozatorių, kol pasirodys pirmas lašas (3 pav.).
5. Atlošę galvą atsargiai įlašinkite į akį 1 lašą (4 pav.).
6. Pakeiskite dozatoriaus kamštelį.




1. Nuo dozatoriaus nuimkite kamštelį.



2. Suimkite dozatorių ranka vienu iš dviejų būdų, kaip parodyta 2 pav.



3. Apverskite buteliuką ir spauskite dozatorių, kol pasirodys pirmas lašas.



4. Laikydami buteliuką apverstą ir spausdami dozatorių, įlašinkite į akį nurodytą lašų skaičių.

GAMINTOJAS

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Kroatija

PLATINTOJAS

(logo Polpharma)

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Lenkija

TINKAMUMO LAIKAS

Nurodyta ant pakuotės.

Tinkamumo laikas po atidarymo yra 6 mėnesiai.

Nevartokite produkto pasibaigus jo tinkamumo laikui.

LAIKYMAS

Produktą laikyti gamintojo pakuotėje, žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

PAKUOTĖ

10 ml



PERŽIŪROS DATA

2024 m. kovo mėn.